

WELL CHILD EXAM - INFANCY: 9 MONTHS

(Meets EPSDT Guidelines)

DATE	
1	

	兒童姓名	兒童由記		出生日期	
	過敏症		目前用藥		
沙情況	自上次體檢後出現的病症/事故/問題/擔憂		4	今天我有一個不明白的問題,關於:	
兒童的					
由家長填寫兒童的情況	是 否我的寶寶會用手吃東西。我的寶寶懂一些詞語。我的寶寶能整夜安睡。我不經常感到悲傷。		是 否 我的寶寶能		
WEIGHT K	G./OZ. PERCENTILE HEIGHT CM/IN. PERCENTILE HEAD CIR. PERCE	NTILE	Diet		
Review of systems Review of family history			Elimination		
			Sleep		
Screening: N A Hearing Vision Development: Circle area of concern Adaptive/Cognitive Language/Communication Gross Motor Social/Emotional Fine Motor Behavior Mental Health Physical: N A General appearance Skin Lungs Head/Fontanelle Eyes (Cover/Uncover) Ears Genitalia Nose Oropharynx/Teeth N A Chest Cardiovascular/Pulses Genitalia Nose Spine Oropharynx/Teeth Extremities		Review Immunization Record Lead Exposure Fluoride Supplements Fluoride Varnish Hct/Hgb Tb Health Education: (Check all discussed/handouts given) Family Planning Safety No Bottle in Bed Development Crib Safety Infant Bond Feeding Fever Teeth Care Bedtime ritual Language Stimulation Stranger Anxiety Appropriate Car Seat Child care Passive Smoke Poison Prevention Other: Assessment/Plan:			
Neck	Neurologic				
Nodes					
		IMMUNIZATIONS GIVEN			
			REFERRALS		
NEXT VISIT: 12 MONTHS OF AGE			HEALTH PROVIDER NAME		
HEALTH PROVIDER SIGNATURE			HEALTH PROVIDER AD	DDRESS	
DSHS 13-68	3D CH (REV. 08/2004)			SEE DICTATION	

DISTRIBUTION: White - Physician Yellow - Parent/Guardian

Guidance to Physicians and Nurse Practitioners for Infancy (9 months)

The following highlight EPSDT screens where practitioners often have questions. They are not comprehensive guidelines.

Fluoride Screen

Look for white spots or decay on teeth. Check for history of decay in family. Fluoride supplements should be considered for all children drinking fluoride deficient (<0.6 ppm F) water. Before supplements are prescribed, it is essential to know the fluoride concentration of the patient's drinking water. Once the fluoride level of the water supply has been evaluated, either through contacting the public health officials or water analysis, as well as evaluating other sources of fluoride, the daily dosage schedule can be recommended. Pediatric Dentistry: Reference Manual 1999--00.(21)5.

Tuberculosis Screen

Screen for these risk factors:

- Members of household with tuberculosis or in close contact with those who have the disease.
- In close contact with recent immigrants or refugees from countries in which tuberculosis common (e.g., Asia, Africa, Central and South America, Pacific Islands); migrant workers; residents of correctional institutions or homeless shelters or persons with certain underlying medical disorders.

Developmental Milestones

Always ask about and follow-up on parent concerns about development or behavior. You may use the following screening list, or use the Ages and Stages Questionnaire, the Denver II, the ELMS2 (a language screen), or the MacArthur Communication Development Inventory.

Yes	No			
		Sits without support.		
		Stands holding on.		
		Cruises.		
		Imitates speech sounds.		
		Thumb-finger grasp.		
		Says "Dada" or Mama" nonspecifically		
		Responds to name.		
		Plays "Peek-a-boo."		
Avoids eye contact.				

Instructions for developmental milestones: At least 90% of infants should achieve <u>the underlined milestones</u> by this age. If you have checked "no" on any two items or even one of the underlined items, or the **boxed item** (abnormal behavior at this age), refer the infant for a formal developmental assessment.

Notes: Immunization schedules are from the Advisory Committee on Immunization Practice of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Parents and providers may call Healthy Mothers, Healthy Babies (1-800-322-2588) with questions or concerns on childhood development.



健康兒童體檢 - 嬰兒期: 9個月 WELL CHILD EXAM - INFANCY: 9 MONTHS

(符合EPSDT早期定期檢查、診斷和治療指南標準)

日期		

嬰兒期:9個月			
	兒童姓名	兒童由誰帶來: 出生日期	
	過敏症	目前用藥	
民	自上次體檢後出現的病症/事故/問題/擔憂	今天我有一個不明白的問題,關於:	
野帽	日上八脰橛绞山况的构业/争议/问题/指变	今天找有一個小明日的问题,關於.	
調兒童			
由家長填寫兒童的情況	是否	是否	
洲田	我的寶寶會用手吃東西。	我的寶寶能自己行動。	
	我的寶寶懂一些詞語。 我的寶寶能整夜安睡。	我的寶寶會玩躲躲貓。	
體重 千克			
歴生 7		飲食	
	系統審核 家族健康史審核	排洩	
		睡眠	
		審核免疫記錄	
檢查:	正常 不正常	氟化物藥品 氟化物鈾劑 Hct/Hgb	
聽力檢		Tb(肺結核)	
視力檢	請勾劃出您感到擔心的方面	—— 保健教育: (勾劃所有已討論過/已發過相關資料的項目) □ 家庭生育計劃 安全 □ 不在床上用奶瓶喂奶	
適應/詢	忍知 語言/交流溝通	發育 嬰兒床安全 嬰兒親附性	
大的 別 行為	L肉運動 社交/情緒 細致的肌肉運動		
心理像	建康		
身體:	正常 不正常 正常 7		
整體外		防止中毒	
皮膚 頭部/[其他:	
	有覆蓋物/無覆蓋物) 腹部	評估/ 計畫:	
耳朵 鼻子			
一			
頸部	神經		
育記叨]異常發現,並請加以評論:		
		已完成的免疫接種	
		轉介	
	下次檢查:12個月	保健服務機構名稱	
保健服務相	機構簽名	保健服務機構地址	

DSHS 13-683D CH (REV. 08/2004)

◎ 参見口述記錄

9個月小寶寶的保健

重要標誌

小寶寶在9至12個月期間的生長發育。

在地板上爬行。

扶靠傢俱站起來並移動。

可以開始走步。

用手指點他要的東西。

自己用杯子喝水。

玩拍手和藏貓貓之類的游戲。

開始説"媽媽"、"爸爸"和"再見"之類的詞語。

您可以在與您的小寶寶玩耍時幫助她學會新 技能。

若需要幫助或詳細資訊,請電

免費發育檢查:

健康母親、健康寶寶資訊和轉介專線 1-800-322-2588 (留言) 或 1-800-833-6388 (TTY中繼轉發)

嬰兒車座椅安全:

安全約束裝置聯盟 1-800-BUCK-L-UP(留言)或 1-800-833-6388(TTY中繼轉發)

有特殊需求的嬰兒:

家長與家長計劃,1-800-821-5927。

中毒預防:

華盛頓州防毒中心,1-800-732-6985(留言) 1-800-572-0639(TTY中繼轉發) 在緊急情況下撥打911緊急電話。

子女教養技巧或支持:

家庭幫助專線 1-800-932-HOPE (4673) 西北地區家庭服務資源 1-888-746-9568當地社區學院課程

保健須知

繼續盡可能以母乳喂養,在至少在第一年應如此。

母乳或嬰兒喂養奶依然是小寶寶最重要的食物。他還需要吃一些軟質泥狀固體食物。

保持小寶寶新牙齒的健康。在喂食後要清潔一下。 可使用干淨的布角或一小粒軟牙膏。不要在床上給 孩子奶瓶。

抗生素並非總是最好的藥物。它們對感冒和其他病 毒無效。在小寶寶不需要時服用抗生素是有害的。

讓小寶寶練習使用杯子。在帶噴嘴的杯子內裝入水、母乳或嬰兒喂養奶。若他使用奶瓶,準備好在他1歲時改用杯子。

您應經常洗手,尤其是在換完尿布後和喂小寶寶 前。用肥皂和水清洗小寶寶的玩具。

子女教養須知

每個小寶寶都在以自己的方式發育。您的小寶寶會不斷地學習和變化。若您覺得他發育不完善,應該告訴您的醫生或護士。關於免費的發育檢查,請電健康母親、健康寶寶資訊(請參見列於左側的電話號碼)。

安全須知

應始終守護在浴盆內的小寶寶。在僅有幾英寸深的 水裡就可能發生溺水,而且事發迅速、無聲無息。 若您必須離開房間,應帶她一起離開。

在小寶寶出生後的第一年內,要始終將其朝車後方 向放在嬰兒車座椅內並繫好安全帶。將他固定在車 後座上,這是兒童乘車最安全的座位。

DSHS 13-683D CH (REV. 08/2004)